

Roundup[®] Plus

Glyphosate (γκλυφοζέιτ) ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων)
και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την
καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος επικοινωνίας,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8,
151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000
www.cropscience.bayer.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
4LT

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: www.hellafarm.gr

1ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία, Τηλ.: 210 6800 900

Αρ. Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά ΥΑΑΤ:
7925/ 20-08-2009

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: glyphosate οξύ 45% β/ο
(υπό μορφή άλατος Καλίου: 55,1% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 63,67% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ



UFI: 1WS1-P03G-1006-F4ED

GROUP 9 HERBICIDE



χελλαφαρμ Α.Ε.

ROUNDUP® PLUS (Ραουντάπ Πλας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωσιωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάχνης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Δεληδρόνικες καλλιέργειες, αμπέλι, βαμβάκι, ακαλλιέργητες εκτάσεις: αυτοπύρκαξη εντοπιζόμενη εφαρμογή με ψεκαστήρα χειρός ή κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύτερη μεταξύ των γραμμών.

Αγρόι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την καταργασία του εδάφους για απορ: καθολικός ψεκασμός. Ομοίομορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.

Για την οροβάχνη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλύψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείται μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάζεται με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του ακευαστικού. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείται ακάθαρτο ή σκληρό νερό για την διασφάλιση του φαρμάκου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάζει τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φίλες ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΒΙΔΙΚΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

• Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή των καρπών με το σκεύασμα ή με το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί. • Να μην εφαρμόζεται στις άκρες χωματόδων και σε στεγνά χαντάκια. • Να μην εφαρμόζεται σε υδατίνες περιοχές ή σε εδάφη που γειτνιάζουν άμεσα με υδατίνες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των χαντακίων και των αναχωμάτων των οριζώντων.

• Να μην επιτρέπεται η βόσκηση ζώων σε αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας στους οποίους έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. • Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες από τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για απορροπαγωγή. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Για τις επιπρόσθετες ελές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. • Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεποιημένες στο έδαφος ελές. • Να μη συλλέγονται ελές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- **ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την καταργασία του εδάφους για απορ ή μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπταόμιον (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την καταργασία του εδάφους.

- **ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Μην εισέρχονται στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.


- **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΠΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ημέρες) (Μ.Α.Ε./Μ.Ε.): ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΦΦΟΥΤ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΜΗΛΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ (Επιτραπέζιες & Οινοπαισιώσιμες ποικιλίες), ΕΛΙΑ (Επιτραπέζιες & Ελαιοληψίσιμες ποικιλίες) α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρότης τους ανάπτυξης. Δόση: 120-160 κ.ε./στρέμμα. Μολόχα (*Molva* sp.), Αντράκλια (*Portulaca oleracea*), Πολυκόμμη (*Polygonum* spp.). **Τσουνκίδα (*Urtica* sp.): Δόση:** 320-480 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/28. β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Δόση: 400-640 κ.ε./στρέμμα. **Αγριάδα (*Cynodon dactylon*): Δόση:** 600-640 κ.ε./στρέμμα. **Βέλουρος (*Sorghum halepense*), Φτέρη (*Pteridium aquilinum*): Δόση:** 400 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/28. **Κύπερη (*Cyperus* sp.): 1^η εφαρμογή** κατά την άνθηση **με Δόση:** 480 κ.ε./στρ. και **2^η εφαρμογή** σε περίπτωση αναβλάστησης **με Δόση:** 400 κ.ε./στρ. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 2.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύτερη μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και τα φύλλα των φυτών. α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Δόση: 120-160 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1. β) Πολυετή ζιζάνια: **Βέλουρος (*Sorghum halepense*): Δόση:** 400 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1. **ΚΑΠΙΝΟΣ:** Οροβάχνη (*Orobanche ramosa*): Ψεκασμός καλύψεως α) 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση **με Δόση:** 32 κ.ε./στρέμμα και β) 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση **με Δόση:** 48 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 2. **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ:** α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρότης τους ανάπτυξης. Δόση: 120-160 κ.ε./στρέμμα. Μολόχα (*Molva* sp.), Αντράκλια (*Portulaca oleracea*), Πολυκόμμη (*Polygonum* spp.). **Τσουνκίδα (*Urtica* sp.): Δόση:** 320-480 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1. β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Δόση: 400-640 κ.ε./στρέμμα. **Αγριάδα (*Cynodon dactylon*): Δόση:** 600-640 κ.ε./στρέμμα. **Βέλουρος (*Sorghum halepense*), Φτέρη (*Pteridium aquilinum*): Δόση:** 400 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1. **ΑΚΑΛΙΕΡΠΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ** (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές) α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρότης τους ανάπτυξης. Στην περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί να καλυφθεί το πολύ το 50% της έκτασης αυτής. Δόση: 120-160 κ.ε./στρέμμα. Μολόχα (*Molva* sp.), Αντράκλια (*Portulaca oleracea*), Πολυκόμμη (*Polygonum* spp.). **Τσουνκίδα (*Urtica* sp.): Δόση:** 320-480 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/21. β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωσιώδη και Πλατύφυλλα): Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. Δόση: 400-800 κ.ε./στρέμμα. **Αγριάδα (*Cynodon dactylon*): Δόση:** 600-800 κ.ε./στρέμμα. **Βέλουρος (*Sorghum halepense*), Φτέρη (*Pteridium aquilinum*): Δόση:** 400-800 κ.ε./στρέμμα. **Μ.Α.Ε./Μ.Ε.:** 1-3/21. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Σε όλες τις χρήσεις εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μόνο στον Καπνό, για την καταπολέμηση της Οροβάχνης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα.

Μέγιστη δόση ανά χρήση για το σύνολο των εφαρμογών/12 μήνες: 432 γρ. glyphosate/στρέμμα.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τριφύρα, βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπυρώνες ή αμπέλιων από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* sp. (Μολόχες), *Urtica* sp. (Τσουκνίδες), *Polygonum* sp. (Πολυκόμποι), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 320-480 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο (1-2) εφαρμογές (χειμώνα- άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
4. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.
5. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.
6. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κίτριδα.
7. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά.
8. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά-Κιτριά, Γκρέιπ φρουτ, Αμυγδαλιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Ελιά, Αμπέλι: 7 ημέρες.

Βαμβάκι: Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής.

Κανόνας: Αγρό μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλιέργητες εκτάσεις: –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα. • Πλύνετε τα χέρια οχολαστικά μετά τον ψεκασμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες. • Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους - χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβάκιου. - να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% για τις υπόλοιπες χρήσεις.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείτε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρήει ο ερεθισμός. • **Σε περίπτωση ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρήει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Ξπλύνετε το στόμα. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Συστηνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή. Η θεραπεία με ατροπίνη και οξίμες δεν ενδείκνυται. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI: 1WS1-P03G-1006-F4ED



